

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-5-65 385833

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS** (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS

C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

**ABONNEMENT ANNUEL**

**15 Francs**

Supplément n° 3 au Bulletin Technique n° 56

21 MAI 1965

- 16 -

AVERTISSEMENTS

MOUCHE DE LA CERISE

ARBRES FRUITIERS

Les premières mouches sont apparues le 16 Mai dans le département de l'Indre et le 18 Mai dans les autres régions.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un premier traitement qui devra être terminé le 26 Mai dans le département de l'Indre et le 28 Mai dans les autres régions, si l'on utilise un produit à action préventive tel que le D.D.T. à raison de 125 g de Matière Active par hectolitre d'eau. Si on emploie des produits à base de Diméthoate (30 g de M.A./hl), de Fenthion (50 g de M.A./hl), de Diazinon (20 g de M.A./hl), d'Oléoparathion (25 g de M.A./hl) l'action en profondeur de ces Matières Actives permet de retarder de 8 jours ce premier traitement.

Nous rappelons que la législation interdit l'utilisation du D.D.T., du Fenthion, des Parathions à moins de 15 jours de la récolte et celle du Diméthoate à moins de 7 jours de la récolte.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

Les risques de contaminations primaires ne sont pas encore terminés de nombreux ascospores pouvant être encore projetés au cours des prochaines pluies. D'autre part on assiste actuellement à des sorties de taches parfois très importantes dans les vergers insuffisamment protégés. D'autres taches pourront encore apparaître dans les prochains jours.

Il est donc conseillé d'effectuer un nouveau traitement qui devra être appliqué au début de la semaine prochaine.

VIGNES

BLACK-ROT DE LA VIGNE

De nouvelles contaminations sont possibles sur les feuilles qui se sont développées depuis le premier traitement. Une nouvelle application est donc nécessaire dès réception de ce Bulletin.

INFORMATIONS

OIDIUM DE LA VIGNE

VIGNES

Les premières manifestations de la maladie sont visibles sur les cépages sensibles. La lutte contre l'Oïdium est d'autant plus facile que le premier traitement a été effectué précocement. Il est donc conseillé de faire une première application sur toutes les vignes sensibles à la maladie.

RHYNCHITE ou CIGARIER

L'activité de ce ravageur est importante dans certains vignobles. Il y a donc lieu d'intervenir le cas échéant en effectuant un traitement avec un insecticide de synthèse.

P./80  
.../...

ROT-BRENNER ou ROUGEOT PARASITAIRE

Dans toutes les régions où l'on redoute cette maladie il est conseillé d'effectuer un traitement dès réception de cette note en utilisant soit une Bouillie Bordelaise à 1,5 %, soit un mélange Zinèbe-Cuivre à la dose indiquée par le fabricant, soit un produit à base de Zinèbe à la dose de 0,5 %.

ERINOSE DE LA VIGNE

De nombreuses manifestations de cette maladie sont visibles dans les vignobles. Il est conseillé d'intervenir le cas échéant en effectuant un traitement avec un produit à base de soufre.

ARAIGNEES ROUGES - ACARIOSE

Des pullulations importantes d'Araignées rouges sont observées dans certains vignobles. D'autre part des manifestations d'Acariose sont également visibles dans certaines régions.

Il est donc conseillé d'intervenir le cas échéant en utilisant un des produits à action systémique ou un des insecticides de contact mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

MILDIOU DE LA VIGNE

Les pluies qui ont débuté le 16 Mai ont pu provoquer quelques contaminations primaires. Les taches consécutives à ces contaminations devraient être visibles à partir du 26 Mai.

Nous demandons donc à tous les viticulteurs de nous envoyer les feuilles malades qu'ils pourraient observer dans leurs vignobles dans le cadre du concours pour la détection des foyers primaires de Mildiou, dont le règlement a été publié dans le Bulletin précédent.

VERS DE LA GRAPPE

Les premiers papillons ont été observés depuis un certain temps dans les vignobles. Les premières pontes ont même été déposées. Cependant, il est encore trop tôt pour effectuer un traitement. Il est nécessaire d'attendre un prochain avis de la Station d'Avertissements.

ARBRES FRUITIERSOIDIUM DU POMMIER

Un nouveau traitement est conseillé contre cette maladie.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les premiers papillons sont déjà sortis depuis un certain temps mais il est encore trop tôt pour effectuer un traitement contre ce ravageur. Il y a lieu d'attendre un nouvel avis de la Station d'Avertissements.

BETTERAVESPEGOMYIE DE LA BETTERAVE

Les premières pontes ont été observées dans certaines cultures. Cependant l'importance de ces pontes est très variable suivant les régions et les champs.

Les traitements doivent être effectués lorsque 50 % des pontes sont écloses et que les larves se trouvent à l'intérieur des feuilles. Seul un examen attentif des cultures permettra de juger de l'opportunité du traitement. On pourra utiliser, le cas échéant un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

Les VContrôleurs chargés des Avertissements

Agricoles,  
G. RIBAUT.  
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,  
G. BENAS.

Imprimé à la Station d'Avertissements d'Orléans.

Le Directeur Gérant : L. BOUYX.